

92.055N

Polikliniek Immunovaccinatie

Jouw zorg
is onze zorg



JAN YPERMAN ZIEKENHUIS

92.055N - 20250605 - Polikliniek Infectieziekten



GEGEVENS PATIËNT

Patiëntenklever

GEGEVENS THUISVERPLEGING

Naam + Voornaam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Deze informatiebrochure is met de grootste zorg opgemaakt. Ze bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met jouw zorgverlener. Jan Yperman Ziekenhuis vzw, onze artsen en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in deze brochure.

Opmerkingen en/of suggesties kan je melden via communicatie@yperman.net

Inhoud

Voorkomen van infecties bij verminderde afweer	3
Doelgroep?	3
Waarom?	4
Hoe?	4
Hoe werken vaccins?	5
Reizen in de toekomst?	5
Bijwerkingen?	5
Wanneer?	6
Wat meebrengen?	6
Afspraak inplannen of vragen?	6



Heb je nog vragen?
Stel ze aan je behandelend arts of een verpleegkundige.



Voorkomen van infecties bij verminderde afweer

Jouw arts verwijst je door omdat je een verminderde afweer hebt of zal hebben in de toekomst. Hierdoor heb je meer risico op het krijgen van bepaalde infecties of kan een infectie ernstiger verlopen bij jou. Dankzij vaccinaties of screening kunnen we dit risico verminderen.



Doelgroep?

Je bent een patiënt met een verminderde afweer door bijvoorbeeld een onderliggende ziekte, als je medicatie gebruikt of zal gebruiken die de afweer onderdrukt of als je een transplantatie hebt gehad of nog zal krijgen.

Polikliniek Infectieziekten Jan Yperman Ziekenhuis

→ dr. K. De Schuyter

→ dr. W. Terryn

Waarom?

Als je een verminderde afweer hebt, heb je een hogere kans op bepaalde infecties. Bovendien kan het verloop van een infectie ook ernstiger zijn. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden om het risico op infecties bij jou te verminderen.

Hoe?

1 Vaccinatie

Je kan je tegen bepaalde infecties beschermen door vaccinatie. Een voorbeeld hiervan is Influenza (griepvirus) of Pneumococci (bacteriën die longontsteking kunnen veroorzaken). Tijdens de consultatie kijken we na welke vaccins voor jou aangewezen zijn. Deze kunnen, zo gewenst, op de consultatie toegediend worden.

2 Opsporen van zogenaamde 'latente' (stille) infecties

Voor het opstarten van medicatie die je afweer vermindert kan het aangewezen zijn je te testen voor latent aanwezige infecties (met behulp van een bloedname). Deze infecties geven meestal geen problemen bij een 'gezond' afweersysteem maar kunnen ernstige ziekte veroorzaken bij patiënten met een afweerstoornis.

Een voorbeeld hiervan is tuberculose. Zo nodig zal dan ook antibiotica moeten gestart worden.

3 Preventie

Jij en je gezin of huisgenoten kunnen enkele voorzorgsmaatregelen nemen die de kans op bepaalde infecties kan verminderen.

Een voorbeeld hiervan is voedselveiligheid om het risico op een voedselvergiftiging te verminderen

Hoe werken vaccins?

Vaccins bestaan meestal uit geïnactiveerde (dode) virussen of deeltjes van bacteriën of virussen. Vaccins kunnen de ziekte zelf niet veroorzaken, maar stimuleren het lichaam om antistoffen aan te maken. Als je dan later in aanraking komt met het virus of de bacterie, wordt die door het lichaam herkend en zullen de juiste antistoffen sneller aangemaakt worden die je dan beschermen tegen de infectie.

Sommige vaccins bevatten levend verzwakt virus. Deze vaccins kunnen veilig gegeven worden bij personen met een normaal afweersysteem. Echter bij patiënten met een verminderde afweer kunnen deze vaccins ernstige ziekte veroorzaken. Daarom mogen levend verzwakte vaccins niet gegeven worden aan mensen met een verminderde afweer. Een voorbeeld hiervan is het Gele koorts vaccin (reisvaccin).

Reizen in de toekomst?

Voor bepaalde (verre) reisbestemmingen zijn bepaalde reisvaccins aangeraden of verplicht. Hiervoor is het ook beter om op tijd te vaccineren, liefst voor opstart van medicatie die de afweer beïnvloeden. Zo kunnen we voorkomen dat je in de toekomst niet naar bepaalde landen zal kunnen reizen omdat je niet de juiste vaccins hebt gekregen. Dit zal besproken worden op de consultatie.



Bijwerkingen?

De meeste vaccins geven geen bijwerkingen of slechts beperkte klachten zoals roodheid, pijn op de plaats van de inspuiting, een stijve arm of milde koorts. Deze symptomen duren meestal niet langer dan 2 dagen.

Wanneer?

Het beste moment om langs te komen is VOOR het opstarten van de behandeling die de afweer zal onderdrukken. Vaccins werken namelijk het best bij een gezond afweersysteem en sommige vaccins (de zogenaamde levend verzwakte vaccins) mogen niet gegeven worden indien je al een verminderde afweer hebt.

Maar ook bij patiënten met al een verminderde afweer blijft vaccineren steeds zinvol om infecties te voorkomen.

Wat meebrengen?

Om de juiste adviezen te kunnen geven is het handig om vaccinatiebewijzen of boekjes uit het verleden mee te brengen naar de consultatie.

Afspraak inplannen of vragen?

Je kan een afspraak Immunovaccinatie inplannen op de polikliniek Infectieziekten op het nummer 057 35 71 80 of via e-mail (Infectieziekten@yperman.net) of online op de website www.infectieziekten.net.



Extra notities:

Jan Yperman Ziekenhuis
Briekestraat 12, 8900 Ieper
info@yperman.net
057 35 35 35
www.yperman.net

